



8. jan. 2026 kl. 10:09

Østmarka NP (utv.): Hele prosjektområdet

Innledning

Denne rapport er utarbeidet for ett område som vurderes for vern av skog. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over naturfaglige kvaliteter til vurderingsområdet og for å kunne vurdere hvordan området fyller målene for skogvernet. Data baseres på innsamlete data gjennom feltkartlegging og andre eksisterende datakilder. Denne rapport er et kunnskapsgrunnlag for videre verneprosess. Samfunnsmessige avveiiinger gjøres som del av verneprosessen og inngår ikke som del av dette dokumentet. Skogvernet skal særlig bidra til å oppfylle følgende nasjonale mål for naturmangfold:

- Ingen arter og naturtyper skal utryddes som følge av menneskelig aktivitet, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.
- Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.

[Her kan du lese mer om bakgrunn for skogvernrapporten](#)

Statsforvalterens vurdering

Denne geometrien tilsvarer hele prosjektområdet

Verneindeks

Naturgitt mangfold	1.25
Variasjon - kartleggingsenheter	2
Arealandel av kalk- og baserik skogsmark og regnskog	0
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for hele området	2
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for kalkrike kartleggingsenheter i området	1

Naturskognærhet	1.83
Død ved arealfigur, arealandel	2
Død ved mengde	2
Død ved variasjon	2
Gamle store trær arealfigur, arealandel	3
Gamle/store trær	2
Trær med spesielt livsmedium	0

Størrelse	2.00
Barskog, bjørkeskog i NB og MB	0
Skogsmark i sørboreal og boreonemoral vegetasjonssone	2
Edellauvskog, kalkskog og regnskog.	0

Scoringsverdi for avgrenset område

5.08

Nøkkeltall

Vegetasjonssone
Sørboreal, boreonemoral og nemoral

Sammendrag av arealressursene fra AR5	
Type	Areal (daa)
Ferskvann	15.90
Skog	1580.66
Åpen fastmark	0.19
Myr	36.62
Sum	1633.37

Skogbonitet fra AR5-kart	
Type	Areal (daa)
Impediment	83.88
Lav	933.46
Middels	441.08
Høy	122.24
Sum	1580.66

Kartleggingsenheter			
Kartleggingsenhet	Kode	Areal (daa)	Kalktrinn
flomskogsmarker på finmateriale	T30-C-2	8.17	Ikke aktuelt
plantasjeskog	T38-C-1	0.57	ikke aktuelt
blåbærskog	T4-C-1	31.34	abc
svak lågurtskog	T4-C-2	14.47	de
lågurtskog	T4-C-3	2.66	fg
bærlyngskog	T4-C-5	823.97	abc
lyngskog	T4-C-9	508.69	abc
kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker	V2-C-1	198.41	bcd
Sum		1588.28	

Naturområde - kategori	
Type	Areal (daa)
Hogstklasse 1 & 2	33.52
Kalkfattig mosaikk	1214.51
Kalkrik mosaikk	5.72
Liggende død ved	117.01
Store gamle trær	217.53

Trær med spesielt livsmedium	
Type	Vektet trinn
Tre med brannspor	0-1 per daa
Hengelavstre	0-1 per daa
Hult lauvtre	0-1 per daa

Treslag	
Type	Vektet trinn
Bjørkeslekta	2,5 - 5
Furu	25 - 50
Gran	50 - 75
Gråor	0 - 2,5
Osp	2,5 - 5
Rogn	0 - 2,5

Treslag	
Selje	0 - 2,5
Bartreandel	90 - 100
Svartor	0 - 2,5

Død ved	
Type	Vektet trinn
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), lite nedbrutt	2-4 per daa
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), sterkt nedbrutt	1-2 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), lite nedbrutt	1-2 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), sterkt nedbrutt	1-2 per daa
Stående død ved , Middels dimensjon (10–30 cm)	1-2 per daa
Stående død ved , Stor dimensjon (> 30 cm)	1-2 per daa

Store gamle trær	
Type	Vektet trinn
Furu	1-2 per daa
Gran	0-1 per daa
Boreale lauvtrær	0-1 per daa
Edellauvtrær	0-1 per daa

Arter				
Navn	Vitenskapelig navn	Artsgruppe	Rødlistestatus	Reg. dato
Gubbeskjegg	Alectoria sarmentosa	lav	Nær truet	2.10.2025
Rosenjodskinn	Amylocorticium subincarnatum	sopp	Sårbar	29.9.2025
Skyggekejuke	Anomoporia kamschatica	sopp	Sårbar	29.9.2025
Ospehvitkejuke	Antrodia pulvinascens	sopp	Nær truet	2.10.2025
Gul snyltekejuke	Antrodiella citrinella	sopp	Nær truet	30.9.2025
Småsmelle	Atocion rupestre	karplanter	Livskraftig	27.9.2023
Kort trollskjegg	Bryoria bicolor	lav	Nær truet	2.10.2025
Sprikeskjegg	Bryoria nadvornikiana	lav	Nær truet	2.10.2025
Ospenålepute	Caliciopsis calicioides	sopp	Sårbar	2.10.2025
Furuskjell	Cladonia parasitica	lav	Nær truet	2.10.2025
Gjøk	Cuculus canorus	fugl	Nær truet	18.5.2011
Dvergspett	Dryobates minor	fugl	Livskraftig	12.12.2022
Myskemaure	Galium triflorum	karplanter	Nær truet	30.9.2025
Druelav	Hertelidea botryosa	lav	Nær truet	2.10.2025

Arter				
Furupiggmusling	Irpicondon pendulus	sopp	Nær truet	20.9.2025
Vedkorallsopp	Lentaria byssiseda	sopp	Nær truet	30.9.2025
Furukorsnebb	Loxia pytyopsittacus	fugl	Livskraftig	9.4.2022
Svartsonekjuke	Phellinus nigrolimitatus	sopp	Nær truet	2.10.2025
Furustokkjuke	Phellinus pini	sopp	Nær truet	29.9.2025
Rynkeskinn	Phlebia centrifuga	sopp	Nær truet	30.9.2025
Tretåspett	Picoides tridactylus	fugl	Nær truet	12.12.2022
Hengekjuke	Postia ceriflua	sopp	Sterkt truet	29.9.2025
Flammenettskinn	Pseudomerulius aureus	sopp	Nær truet	29.9.2025
Flammekjuke	Pycnoporellus fulgens	sopp	Nær truet	29.9.2025
Molte	Rubus chamaemorus	karplanter	Livskraftig	22.6.2023
Kystdoggnål	Sclerophora peronella	lav	Nær truet	30.9.2025
Prikkporekjuke	Skeletocutis jelicii	sopp	Sterkt truet	30.9.2025

Rødlistede naturtyper



Rødlistede naturtyper		
Type	Status	Areal (daa)
Flomskogsmark	Sårbar (VU)	8.17

Kartleggers vurdering av prosjektområdet


Østmarka NP (Utv.) er et småkupert område dominert av fattig barskog. Kollene og enkelte av myrene er furudominert, ellers er det granskog med innslag av boreale løvtrær som dominerer. Det er påfallende få nye hogstinngrep i området. Det er innslag av gamle trær i nesten hele området, og store deler av arealet har spredte forekomster av dødved i ulike nedbrytningsstadier. I friskere skråninger og kløfter med høye boniteter, er det granskog med mye dødved. Flere steder er det rikelig med dødved av store dimensjoner i ulike nedbrytningsstadier. Det er registrert mange rødlistede arter knyttet til liggende dødved av gran som indikerer kontinuitet i tilgang til dødved: blant annet prikkporekjuke (EN) og rosenjodskinn (VU). Den mest velutviklede granskogen er i nordre del av Vinholdalen, som i stor grad har naturskogsdynamikk. Furukollene har stort sett høy tetthet av gamle trær, og flere steder er det betydelig innslag av keloelementer og soleksponert dødved i ulike nedbrytningsstadier. Dette gjelder særlig i den sørvestvendte skråningen ned mot Vinholdalen, men også flere andre mindre områder. Det er registrert flere rødlistede arter knyttet til gammel furuskog, på liggende dødved, på kelogadder-stubber og gamle trær. Det er innslag av store, grove osp i store deler av området, og enkelte store læger i ulike nedbrytningsstadier. Tettheten er sjelden høy nok til å gi utslag på variabelen, men samlet sett er det i realiteten veldig mange grove osp, og med tilhørende arter. Det er blant annet funnet rikelig med ospenålepute (VU), en art som ellers har få registreringer sørøst for Oslo. I tillegg er det funnet 3 NT-arter på osp i området: kystdoggnål, vedkorallsopp og ospehvitkjuke. Det er også samlet kandidater til Edellundlav (EN), som ennå ikke er mikroskopert. Det er innslag av kløfter og nordøstvendte bergvegger med stabil høy luftfuktighet (Uttørkingseksposering trinn B). Dette gjelder primært kløften i Vinholdalen og de nordøstvendte bergene mellom Kristenseteråsen og Rottjern, men trolig også andre mindre lommer, der det er funnet flere arter knyttet til stabil høy luftfuktighet. Blant annet ble det funnet kort trollskjegg (NT), randkvistlav, gammelgranlav, kattedotlav og myskemaure (NT). Det er nokså lite variasjon i selve grunnforholdene og dermed er det også nokså lite variasjon i kartleggingsenheter. Fattige typer dominerer (bærlyngskog, blåbærskog samt lyngskog), men det er noe innslag av svak lågurt, og lågurtskog i enkelte fuktigste. Det er betydelig innslag av fattig sumpskog, åpen jordvannsmyr og også tresatt nedbørsmyr (som ikke finnes i NiN2, men i NiN3, og derfor er kartlagt som fattig sumpskog her). Majoriteten av myrene og myrskogene er grøftet. Det er en liten flekk med svartorsumpskog ved Skøttemyra (som også er grøftet), ellers er det i all hovedsak gran, furu og bjørk som dominerer myrskogene i området. Av rødlistede naturtyper er det omtrent 6 dekar med flomskogsmark (VU), samt mulig innslag av en liten platåhøymyr (EN) med tresatt nedbørsmyr (sør for Vesle Forfloten). Området oppfyller utvilsomt regionale mangler i skogvernet (Fremstad et al., 2017) ved å inneholde gammel granskog og furuskog med minst regional verdi (B/**), samt større forekomster, areal i lavlandet med naturskogselementer. Det er også betydelig innslag av skog på høy bonitet. Østmark NP (Utv.) vurderes å ha store naturkvaliteter (nasjonalt verneverdig) fordi det omfatter et stort sammenhengende område med gammel kontinuitetsbarskog i lavlandet. Det trekker også betydelig opp at området grenser til et enda større vernet gammelskogsområdet (Østmarka). Videre trekker det opp at det er funnet mange indikatorarter knyttet til granskog, furuskog og osp, samt skogmiljøer med stabil høy luftfuktighet. (Snorre Sundsbø, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS).

Kart verneindeks -
naturskognærhet

Kart verneindeks - Naturgitt
mangfold



Kart rødlistede naturtyper



Mørkeblå farge angir naturområder som i sin helhet er rødlistet, lyseblå farge angir naturområder hvor deler av arealet er rødlistet

