




Fylkesmannen i Møre og Romsdal

SMITTEVERNKONFERANSE 2013







- Med någø attåt, dokumentasjon, tilsynserfaring og forskrivning
- Samarbeid mellom mattilsynet og kommuner ved matsmitte
- Antibiotikaresistens
- Antibiotikaveileder
- Seksuell helse
- Smittevern i helseinstitusjoner for eldre
- Sysvak



HPV-Vaksine





Livmorhalskreft

- Verdensbasis kreftform nr. 2 (500 000/år., 250 000 dør)
- Norge 300/år. nye tilfeller, 100 dør
- 99% skyldes HPV infeksjon.
- Det finnes over 100 genotyper av viruset
- 12 typer ansees patogene
- HPV lar seg ikke behandle med medikament
- 70% av seksuelt aktive blir smittet.



Livmorhalskreft 2

- Forstadier til kreften lar seg påvise
- Antall krefttilfeller og dødlighet er redusert ved screning
- Anbefalt celleprøver/cytologi /3 år- 25-70 år
- Forstadier lar seg behandle lettere med moderne metoder, men fører fortsatt til mulige svangerskapskomplikasjoner



Livmorhalskreft 3

- Påvist kreft behandles primært med kirurgi (evt. med robot)
- Avansert former med stråling og cellegift
- Behandlingen gir ofte mye komplikasjoner og plager hos de som overlever.
- Residivfrekvens stor også sannsynligvis for forstadier



HPV-vaksine

- Selv om viruset har mange patogene genotyper står to typer for 70 % av tilfellene av celleforandringer(kreft) type 16 og 18.
- De to vaksinene på det norske marked beskytter mot disse to typene, den ene også mot type 6 og 11 som forårsaker kjønnsvorter.
- Vaksinen er forebyggende og bør gis før seksuell debut



HPV-Vaksine 2

- Det er bivirkninger av vaksinen men lite alvorlige, ingen dødsfall påvist
- Det er startet barnevaksinasjonsprogram for 7-klassinger siden høsten 2009
- 3 vaksiner i løpet av ett år
- Deltagelsen varierer fra 50-80 % av kullet.



- Informasjon finnes på www.fhi.no : Faktahefte for helsepersonell
- Sosial og helsedir.: Forebygging av livmorhalskreft feb 2008