

MELDING
om
FISKERIBIOLOGISKE GRANSKINGAR
I
ROGALAND

1968

Navnet på vatnet,..... Søre Forevatn
Kommune..... Bjerkreim

Feltarbeidet, videre arbeid
med materialet og skriving av
meldinga er utført av
Rogaland Skogselskap v/ E. Berg.
Meldinga er gjennomlest og god-
kjent av Konsulenten for fersk-
vannsfisket i Vest-Norge,
herr Øivind Vasshaug.

Forord.

I innleiinga som fylgjer på neste side har eg for ein stor del gjort meg nytte av dei erfaringar og rapportar som er utført i samband med gransking av fiskevatn i Sogn og Fjordane fylke. Det er som kjent dette fylket som er kome lengst på Vestlandet når det gjeld analysering av fiskevatn og det er nåverande konsulent Øivind Vasshaug som starta arbeidet i 1962.

Vidare har konsuleht Vasshaug utarbeidd eit generellt oversyn over fiskeribiologiske granskningar i Møre og Romsdal fylke og også denne rapporten har eg fått utlånt, då ein stor del av innhaldet her med fordel kan overførast til Rogaland fylke,

Eg er takksam for at eg fekk koma til Bergen for å gå gjennom prøver av innsamla materiell m.v. og for den hjelp Vasshaug og assistent Møkkelgjerd har ytt. Utan denne hjelpa ville eg ikkje ha kunna utført det arbeidet som nå er gjort.

Tilslutt vil eg vone, at denne rapporten vil vera til hjelp ved kultivering av vatna og at den gir eit nokonlunde rett bilet av tilhøva i dag. Det seier seg sjølv at det kan vera feil i konklusjonane mine, då det heile er utarbeidd berre ved hjelp av stikkprøver. Det beste ville vore om ein kunne lege nokre dagar ved kvart vatn, og tatt mange prøvar av mange slag, men dette ville bli for kostbart. Om konklusjonane såleis ikkje skulle stemme med dei faktiske tilhøva, får vi ta ein ny analyse.

Skulle det elles vera noko uklårt i den rapporten som følgjer står eg gjerne til tenesta for å drofta saka nærare. I vanskeligare spørsmål kan ein venda seg til konsulent Vasshaug som vil gi råd og rettleiing.

Innleiing:

Eg skal her gjera greie for ein del av dei viktigaste spursmåla som melder seg i samband med rekt og stell av fiskevatn og tek til med

Målsetjinga:

Det første ein må ha greie på når ein skal gi råd i stell av fiskevatn er den målsetjinga som grunneigaren har. Ein kan her gjerne nytta den inndelinga og utforminga som konsulent Vasshaug brukar og dele vatna inn i 4 slag:

1. Sportsfiskevatn - få, men stor fisk.
2. Fritidsfiskevatn - mange, men små fisk.
3. Husbehovsvatn - rikeleg med fisk i matnyttig storleik.
4. Yrkesfiskevatn - størst mogeleg antall fisk av salbar storleik,

Målsetjinga er for ein stor del bestemmande for driftsformen og avkastinga av vatnet.

Sportsfiskevatn må helst ha fisk frå 1/2 kg. og oppover, sjølv om avkastinga blir heller liten. Det er dei meir tålmodige med fiskestanga, som gjerne tek seg god tid for å få ein "fin fisk", som desse vatna høver for.

Fritidsvatna kan gjerne vera tett befolka, Det er slike vatn som heile familien kan reisa til og der både born og vaksne kan rekna med som sikkert å få fisk, utan å streva for hardt.

Husbehovsvatna kan oftaast jemstellast med fritidsvatna, men antall fisk og kvalitet må halde krava til "matauke", d.v.s. fisk av høveleg storleik og som det er heller lett å fanga.

Yrkesfiskevatna må drivast som eit reint næringsfiske og etter økonomiske retningsliner og der innkomene må stå i eit positivt høve til utlogene.

Kultivering:

Eit kvart vatn har eit visst næringsgrunnlag. Det kan fø eit visst antall fiskar og gje ei viss mengd fiskekjøt pr. år. Blir ikkje denne produksjonen tatt ut av vatnet, hopar den seg opp og fører til altfor mange fiskar. Det blir for lite næring til kvar einskilt fisk, som difor vil bli småfallen og av dårlig kvalitet. Det er dette som er tilfelle i dei overbefolka vatna.

I nokre vatn kan kanskje tilhøva vera motsatt. Her blir fiska så hardt at fisken blir tatt ut før den har nådd toppen av vekstkurven. Det er alikevel mykje betre å drive eit vatn for hardt enn at det vert overbefolka, for om eit vatn er rimeleg stort er det på det næreste uråd å fiske det tomt med vanleg reiskap.

Avkastinga i vatna:

Når ein snakkar om den årlege avkastinga i eit fiskevatn, meiner ein den kjøttvekt som blir tatt opp pr. år eller sagt på ein annan måte, antall kg. pr. hektar (tomål).

Det er berre dei som har ført notater eller boker over eit lengere tidsrom som kan leggja fram sikre tal for avkastinga i vatna. Det var ynskjeleg om dei som steller med vatna ville føre slike notater.

Generelt kan ein seia at gjennomsnittsavkastinga for vatna på Vestlandet ligg på ca. 2-3 kg. pr. hektar pr. år.

Grunne vatn vil som regel produsere meir næring, og følgjeleg meir fiskekjøt, enn djupe vatn.

Gjødsling:

Med omsyn til gjødsling av fiskevatn så siterar eg nokre avsnitt frå den nyleg utgjevne boka "Fiskestoll i ferskvann" av Lars Nordby.

"Plantelivet i fiskevann er naturgrunnlaget, og en økning i planteproduksjonen ved gjødsling, har vært provd flere steder. Det har vist seg å gi utslag, men det blir delvis kostbart.

Gjødslingen er ikke noe universalmiddel til å heve avkasningen, og de stedelige forhold må nøye tas i betraktning før en går til dette skritt.

Vannets kjemiske sammensetning og bunnforholdene må bringes på det rene, fordi disse forhold bestemmer gjødseltypen. Det er gjødseltyper med fosforinnhold som er mest aktuelle og av disse er antagelig tomasfosfat gunstigst, da den også inneholder ca. 50% kalk og følgelig virker i alkalisk retning. Den kan strøs ut på isen langs land om våren, og p.g.a. sin mørke farge tiner den gjennom isen og synker til bunns.

Er det strøm i vannet er gjødsling bortkastet. På dyp over 3-4 m. har gjødsling neppe noen verdi, og muligens ikke dypere enn 2 m. Det er plantenes vekstfelter, som bestemmes av tilgangen på lys som er avgjørende"

Etter at eg har lest igjennom div. skriv vedk. gjødsling, må det vera rett å seia at det heile ennå nærmest ligg på eksperimentstadiet. Ein antek at det i einskilde høve kan vera lønsamt. Vatna må i alle høve ikkje gjødslast for mykje, då dette kan føra til gjengroing og for sterk oppbloming av nye alger.

Vatn som blir nytta eller har tilknyting til basseng for vassverk e.l. må ikkje gjødslast.

Nye fiskearter:

Fiskeritekniker Kato Lunder skriv i samband med fiskerigranskingane i Sogn og Fjordane.

" Det er et ordtak som sier "en vet hvad en har, men ikke hva en får" og dette ordtaket må en alltid ha for øyet, når vi skal diskutere event. nye fiskearter. Jeg har tidligere i den anledning pekt på, at vi må være glade for at auren er dominerende her i fylket. Spørsmålet om f.eks. innplanting av regnbueaure, er noe som stadig kommer igjen og det er ikke min mening å hindre slike utsettinger, men noen revolusjon kan en ikke kan en ikke regne med. I de fleste tilfeller vil nok regnbueauren få en raskere vekst enn vanlig aure, men vi vet at det er uhyre vanskelig å få regnbueauren til å danne en varig stamme i et vann uten stadig tilførsel av ny fisk. Gytingen vil liksom ikke slå til under norske forhold. Dessuten er det ikke uten videre tillatt etter norsk lov å sette ut nye fiskearter i et vann, der disse arter ikke er fra før".

Sjukdomar på fisken:

Det er særleg i overbefolka vatn der er fåre for sjukdomar og parasittar. Om ein prøver å halde fiskemengda på eit normalt nivå, og ikkje lar vatna overbefolka, skulle ein vera nokonlunde på den sikre sida.

Fiskeandmarken vil ein finna i dei fleste vatna her i landet. På innvollane av aure og røyr kan ein finna små kvite kuler, gjerne så store som ei ert, men vanlegvis mindre. Set ein hol på ei såkalla "cyste" kjem det ut ein mark og dette er eit stadie i livssyklusen til fiskeandmarken. Fiskeandmarken representerar ikkje nokon fåre for menneskje, og ser heller ikkje ut til å verka noko særleg inn på trivselen i fisken, men noko vakkert syn er den ikkje.

Måkemarken er særleg utbredt i vatna i låglandet og ein finn den berre i vatn kor der er stingsild. Stingsilda er lett å kjenna, då den har tre store pigger framfor ryggfinnen og ein framfor kvar brystfinn. Det er ein framifrå matfisk for auren, men den er mellomvert for bendlormen "måkemark". Når auren et stingsilda kjem bendlorm-larva ut i bukhula og kapsler seg inn i store blærer. Etter ei tid med stingsild-dietet vil der vera så mange av desse cystene at auren dør og flyt opp og måken, som er åtseletar, tek denne daude fisken og blir infisert med bendlormen, som har sitt vaksne stadium her. Denne produserar egg som går ut i vatnet med avferinga til måken. Larvene kan bli opp til 60 cm. heilt utstreckte.

Har ein fått måkemakk i eit vatn, er det beste botemidlet og drive eit hardt fiske og å halde måkane borte frå vatnet om dette let seg gjera. Då den mindre auren i vatnet ikkje ernærer seg med stingsild har denne heller ikkje måkemark i seg. Det er difor dei medels store og store aurane ein må få tak i og ved å setje ut garn i bekkjeosar og liknande stader

om hausten, kan ein ikkje ta opp mykje av den infiserte fisken. Likeså bør ein skyte alle måkar som har fast tilhald i vatnet. Måkar som kjem ein snarvisitt innfrå sjøen, er sjeldan infisert med måkemark og såleis mindre farlege.

I denne samanhengen er det særleg viktig at ein ikkje kastar fisk eller avfall frå seg, men at ein anten brenn dette eller gryv det forsvarleg ned.

Den kjemiske samansettningen i vatna:

Leiingsemna i vatnet,

Verdet som vert kalla K_18 er eit mål for det totale innhald av elektrolyttar i vatnet. Om f.eks. to vatn har det same innhald av kalk og magnesium, vil dette gi omlag same verdi for leiingsemna, men inneholder det eine kloridet så vil leiingsemna auka for dette vatnet.

Hardheit:

I dei granska vatna er den totale hardheita analysert og denne gir uttrykk for den mengd kalsium (kalk) og magnesiumsalter som er til stades. Det er av stor interesse å få greie på dette, då livet i vatnet i stor mon er avhengig av desse stoffa. Verdet er uttrykt som Ca CO_3 i milligram pr. liter (mg./l),

pH.

Surheita i vatna, eller pH verdet, reknast frå 0 til 14 med 7 som det nøytrale medelpunkt. Dei ulike verdiane for pH gir uttrykk for hydrogenionekonsentrasjonen i vatnet og frå 7 og nedover mot 0 stig konsentrasjonen - vatnet blir surare. Omvendt blir det når det går frå 7 mot 14 og vatnet er meir alkalisk. pH millom 6.0-8.0 reknast for å vera bra for auren. Er pH under 5.0 er det fåre for rogn og yngel.

Kalk:

Den viktigaste oppgåva kalken har er å fremmma bakterirfloraen og dermed nedbrytinga og omsettinga av organisk stoff. Kalken er viktig for oppbygginga av beinstrukturen hjå fisken og likeeins for skalldyra. Dessuten verkar kalken som buffer og hjelper såleis til å halde ein meir stabil pH.

Kalkinnhaldet i vatnet er uttrykt i milligram pr. liter(CaCO_3/l).

I dei fleste granska fiskevatna på Vestlandet er kalkinnhaldet heller lite. Vi kan nytta følgjande inndeling etter Vestlands-tilhøva

0 - 5 mg. CaCO_3/l må reknast som kalkfattig

5 - 10 " " medels kalkinnhald

over 10" " relativt bra kalkinnhald

Kor mykkje kalk som må tilførast for å oppnå optimale tilhøve for auren sin vekst og trivsel er ofte blitt drøfta, men eg set her opp ein tabell henta frå Sogn og Fjordane der fiskeritekniker Kato Lunder opererer med eit skjema frå Fiskerifagsskulen i Sverige.

Antall kg. pr. hektar (10 mål).

Alle tala i rutene må gangast med 100 for å få riktig kalkmengd.

pH.	Tung botn	Medels botn	Lett botn
5	20-40 kg.	10-20 kg.	5-10 kg.
5-6	10-15 "	5-10 "	2,5- 5 "
6-7	5 "	5 "	1 "

1. Tung botn = leire
2. Medels botn = vanleg svart mudder
3. Lett botn = sand

Kalken som blir brukt er vanleg landbrukskalk.

Det er fleire måtar ein kan spre kalkmølet på. Enten frå båt om sumaren eller ein kan leggja det ut på isen om våren. Det er først og fremst vatn med liten gjennomstøyming som det løner seg å kalka. Er gjennomstøymingen stor, vil kalken drive nedover å ha liten verknad på det vatnet den var tiltenkt. I tabellen ovanfor er rekna med relativt liten gjennomstøyming.

I vatn med sterkare gjennomstøyming kan ein brukka kalkstein som blir lagt i innlaupsbekkjene og då på stader som er utsatte for straum f.eks. under fossar o.l. Pukksteinsterrelse er bra - skjellsand er fint.

Næringsanalyse:

Botnprøver:

I dei fleste granska vatna er det teke botnprøver på 2 og 5 m djup. Prøvane er tekne med "Pettersens bunnhenter" og 5 grabbar utgjer $0,1 \text{ m}^2$. Dette botnmaterialet blir hella over i ei sileramme og skylla godt. Alt levande liv som ein då finn blir analysert og tallt. Multipliserar ein individtalet med 10 finn ein antall individer pr. m^2 og gir ein grov peiling på produksjons- tilhøva.

o-	500 individer pr. m^2	indikerar lite botndyr
500-	1500 " "	" " medels med botndyr
1500-	5000 " "	" " rikt med botndyr
over	5000 " "	" " særskilt mykkje botndyr

Resultata av botnprøvane står oppførte under dei eiskilte vatna.

Fjæreplukk.

I nokre vatn er det plukka stein i strandkanter og desse er blitt nye granska. Alle individer som er fundne er notert og tekne med under kvart vatn.

Planktonprøver.

Det er foreteke både horisontale og vertikale plankontrekk, med planktonhov i alle vatna. Planktonmengda er gruppert i 3 såleis: Mykje plankton, medels med plankton og lite plankton.

Fargen på vatnet.

Ved hjelp av ei kvit sikteskive har ein teke fargen på vatnet. Er fargen blå eller blågrønn indikerar dette eit oligotrof eller næringsfattig vatn. Er fargen gul til gul-grøn indikerar dette eit eutrof eller næringsrikt vatn, men er siktedypt samtidig stort er vatnet helst oligotroft. Er fargen brun eller brunleg-gul indikerar dette myrvatn.

Prøvane her må berre nyttast som ein peikepinn i samband med andre tekne prøver og vil vera til hjelp når konklusjonane skal skrivast.

Opplysingar om fisken.

Under dei einskilte vatna vil De finna eit oversyn, over aurens vekst, slik som oppsett nedanfor, og det er her medeltala ein opererer med. Det er difor lett å samanlikna tala med andre vatn.

Eksempel:

	1år	2år	3år	4år	5år	6år	7år
Medel-							
tilvekst	4.0	9.2	15.9	22.8	26.1	28.2	29.1
Årleg tilv.	4.0	5.2	6.7	6.9	3.3	2.1	0.9
Antall							
fisk	25	25	22	20	13	4	1

Medel kondisjonsfaktor $K = 1.1$

Desse tala er framkomne ved å summere fiskelistene. Den øverste talrekka fortel oss korleis fisken har vakse. Fyrste året 4.0 cm, andre året 9.2 cm, tredje året 15.9 o.sv. Den eldste fisken er her 7 år av alder og har ei lengd på 29.1 cm.

Trekkjer vi å det lågare tal frå det høgare, får vi talrekka nedanfor, den årlige tilveksten. Den seier oss at fyrste året vaks fisken 4.0 cm, andre året 5.2 cm, tredje året 6.7 cm o.s.v. men tala fell av mot lågare verdiar på slutten. Dette heng saman med vekst-stagnasjon i samband med kjønnsmodning og alderdom. Det kan ofte forekoma at ein får minus-verdier her, når materiale er tynt og når fisken viser eit sær ujamnt vekstlaup individane seg imellom. Ein snarvaksande fisk dreg verdiane opp, medan ein seinvaksen eldre fisk dreg verdiane ned.

Tala under streken syner antall fiskar som går inn i medelet. Ved å subtrahere 2 på kvarandre følgjande tal, får vi greie på kor mange 1 åringar, 2 åringar, 3 åringar o.s.v. som er med i prøvematerialet.

Kondisjonsfaktoren:

Kondisjonsfaktoren er rekne ut etter følgjande formel:

$$K = \frac{\text{vekta} \times 100}{\text{lengda}^3}$$

Den vil gi oss verdiar frå 0,5 til 1,5 og fortel korleis tilhovet mellom vekt og lengde ser ut. Ein lang tynn fisk gir svært liten verdi, medan ein fisk med lite hovud, stor kropp og feit gir høg verdi.

Det talet ein kjem fram til er svært unøyaktig og må berre brukast i samanheng med andre faktorar eller berre som peikepinn. Ein feil avlest lengde gir stort utslag når talet blir sett i tredje potens. Det er mykkje vanleg at dei små fiskane får høge faktorar, og dette skuldast ofte at verdiane er lest av unøyaktig.

Ein fisk med kondisjonsfaktor $K = 1,0$ reknast for å vera ein normal fisk.

Vekstkurven:

Under kvart av dei granska vatna er der sett opp ein vekstkurve som syner korleis fisken i dei einskilde vatna ligg an i hove til normal tilvekst. Ein slik normalkurve er også inntegnet for samanlikning.

Den normale lengde-tilveksten for fisk i Vestlands-vatn reknast å liggja på 5 cm. pr. år.

Årsklassar:

Fordelinga av prøvematerialet i lengdegrupper er sett opp under dei einskilde vatna og vidare er fangstfordelinga på omfar sett opp for dei fleste vatna.

Eg skal så gå over til dei prøver og analyser som er tekne ved dei einskilde vatna, då det vel kanskje er dette som er av størst interesse.

S Ø R E F O R E V A T N.

Vatnet ligg i Bjerkreim kommune, nærmere stadfest ca., 500 m nord-vest for garden Hetland og grensar i sør og vest mot Hetland statsskog. H.o.h. 118 m. Største lengde ca. 1600 m og største bredder ca. 450 m med eit areal på omlag 50 ha.

Det er stort sett eit grunt vatn og har neppe djupne over 20 m, men dette er ikkje målt.

Stranda består for ein stor del av større og mindre stein, men innimellan vil ein finna grus og sandstrand.

Det er jørme og mudderbotn over storparten av vatnet. Noko grus og steinbotn vil ein finna i den nordre delen.

Vegetasjon og nedslagsfelt:

Botngras, moser og alger utgjer vegetasjonen i vatnet frå stranda og ut mot djupet. I stranda veks det nokre stader sivplanter. I sør og vest grensar vatnet mot kultivert furuskog, medan ein på austsida vil finna spredt lauvskog der grunnfjellet ligg i dagen. Hovudbergartene er granitt og gneis. Vegetasjonen her består av pors, kvitlyng, rome, einer, røslyng m.v. som alle er mindre kravfulle planter. Same vegetasjonen vil ein og finna over store deler av nedslagsfeltet

Hovudtilsiget kjem frå Nordre Forevatn, men der kjem og eit større tilsig frå eit par vatn i nord-vest og endeleg eit tilsig frå eit par vatn i den sør-vestre delen av vatnet.

Avlaupet renn ut i Hetlandsvatnet som ligg ca. 800 m sør-aust for s. Forevatn.

Dei kjemiske tilhøva.

Siktedjupet er 13 m og vass-fargen blålig-grønn som indikerar eit oligotrof eller næringsfattig vatn.

Surheita pH vart målt to stader og syntte begge stader 6.2 som reknast å vera tåleg bra for aure.

Innhaldet av kalk (Ca CO_3) er 3.4 mg/l og den totale hardheita 8.4 mg/l. Vatnet er såleis kalkfattig, men ligg likevel i overkant av det som til denne tid er funne i andre analyserte vatn.

Leiingsemna $K_{18} = 40.6 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ -1}$.

Der er ikkje forurensingar i vatnet og gjennomstøyminga må karakteriserast som medels til liten.

Faunaen i vatnet:

Ein tok botnprøve på 2 m djup og det vart her funne 2 stk. vårflogelarver tilsvarende 20 individ pr. m^2 . Dette er særslite.

For å få greie på kva fisken eigentleg ernærar seg av, tok ein mageprøver av i alt 5 fiskar. Her vart funne plankton og planktoniske krepsdyr, vasslopper, linsekreps, fjærmygglarver og pupper, maur, humle, fiskerester, bythotrephes longimanus og div. overflate innsekter. Av desse var fjærmyggupper i dominans.

Fjæreplukk:

5 steinar av medels storlek vart her nøygranska og ein fann ein vasskalv og store mengder egg av vårflogelarva. I det heile var der særslite mykje av desse eggklasane i strandkanten.


Planktonprøve:

Det vart teke både horisontale og vertikale plankontrekk, med planktonhov, og resultatet: Medels til lite plankton.

Fisk:

Der er 3 slag fisk i vatnet: Aure, reyr og ål.

Ein sette ut 10 garn av ymse maskestorlek og resultatet etter 1 fangstnatt vart 38 aurar som deler seg slik på omfara:




Prøvematerialet besto av 24 aurar og av desse var 3 raude, 15 lys-raude og 6 kvite i fiskekjøttet.

Der var 14 hannfiskar og 10 hofuskar - ei normal kjønnsfordeling.

Ein fann ikkje parasittar (snyltarar) i nokre av dei fanga fiskane.

Medel fyllingsgrad 1,9 - dette er særslite.

Fordeler ein heile fangsten på cm-klassar vil ei grafisk framsyning sjå slik ut:




Ser vi på medellengda og den årlege medeltilveksten vil denne gå fram av oppstillinga nedenfor:

	Alder ved vinter				
	1år	2år	3år	4år	5år
Medel lengde i cm,	7,0	13,5	19,5	21,2	23,8
Årleg medeltilvekst cm,	7,0	6,5	6,0	1,7	2,6
Antall fiskar	24	24	22	10	5

Medel kondisjonsfaktor $K = 0,94$

Set vi opp ein vekstkurve for fisken i s. Forevatnet og samanliknar med normalkurven for Vestlandet (5cm pr. år) vil denne sjå ut som vist på neste side.

Fisken i s. Forevatn syner her ein særslig god lengdetilvekst dei 3 første åra av sitt liv, men ved 3 års alder kuliminerar veksten og ligg ved 5 års alder 1,2 cm under normalkurven.



Av fiskeskjemaet går det fram, at fisken startar gytinga ved 3års alder og det er vanleg at ein får ein stagnasjon i veksten i samband med kjønnsmogning og gyting. Det er sikkert denne som her gjer seg gjeldande.

Maksimallengda på fisken slik tilhøva er i dag vil liggja på omlag 30 cm og får ein kondisjonsfaktoren opp i 1.0 svarar dette til fisk på ca 270 gram, som må seiast å vera brukbar storleik.

Konklusjon:

Ut frå dei foretekne prøvene må vatnet karakteriserast som næringsfattig. Siktedjupet er stort, kalkinnhaldet er lite og botnprøven gav som resultat særslite med botndyr. Dette er den viktigaste fiskeføda for auren. Vegetasjonen i og omkring vatnet er mindre kravfull, bergartene er harde og forvitrar seint slik at det er lite med næringsstoff som blir tilført vatnet gjennom tilsiga.

Fisken syner likevel ein god lengdetilvekst i dei 3 første åra, men kondisjonsfaktoren indikerar mager til medels fisk,

Bortsett frå at gytinga er ei medverkande årsak til vekststagnasjonen ved 3 års alder, er det også rimelig at fisken ved denne alder går over frå å leva av små næringsdyr til større næringsdyr, kvervellause dyr og mindre fisk. Det kan såleis etter vekst-alderskurven synast som om det først og fremst er

mangel på dei sterre næringadyra i vatnet - noko som også botnprøven syner.

Gytetilhøva er gode både i avlaups- og tilsigsbekker så rekrutteringa av yngel er sikra,

Ser vi på cm-klassane er dei fleste fiskane å finna i klassane 19-21 og 21-23. Vidare vart 60 % av heile fangsten teken på garn av omf. 32.

Praktiske tiltak:

Søre Forevatn er litt av ei perle. Skogkledde holmar og skjær med vikar og bukter gir den reine idyllen. Vatnet eignar seg såleis godt for sportsfiske.

Kor hardt fiske det har vore drive i dette vatnet ned gjennom åra har eg ingen kjennskap til. Det kan sjå ut som om næringssforrådet står i eit nokonlunde rimeleg høve til fiskebestanden. Vatnet er såleis ikkje overbefolka i dag, men dei sterre aurane er mangelvare. Ved å drive eit noko hardare fiske i åra framover er det grunn til å tru at ein vil få fram sterre fisk, og med ein høgare kondisjonsfaktor. Ein bør bruke småmaska garn omf. 26-28.

Då eg har fått opplyst at der er mykje røye i vatnet, blir det opp til grunneigarane å avgjøre kva fiskeslag ein helst må tilgodesjå. Som regel er det slik, at røye har stor formeringsemne og fåren for overbefolking er alltid til stades. Kan ein halde fiskebestandet på eit rimeleg nivå, er røya ein god og fullverdig matfisk. Røye og aure går ikkje alltid godt saman og oftast er det auren det går ut over.

Nordre Forevatn må ein sjå i samanheng med dette vatnet, då fisken går om kvarandre i desse vatna. Ved å ta ein analyse også av dette vatnet ville ein få eit breiare og sikrare grunnlag til å vurdere dei praktiske tiltaka som event. må setjast ut i livet.

Stavanger 18. juni 1969

Einar Berg.