



5. aug. 2025 kl. 09:12

Andvika: Verneforslag

Innledning

Denne rapport er utarbeidet for ett område som vurderes for vern av skog. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over naturfaglige kvaliteter til vurderingsområdet og for å kunne vurdere hvordan området fyller målene for skogvernet. Data baseres på innsamlete data gjennom feltkartlegging og andre eksisterende datakilder. Denne rapport er et kunnskapsgrunnlag for videre verneprosess. Samfunnsmessige avveiiinger gjøres som del av verneprosessen og inngår ikke som del av dette dokumentet. Skogvernet skal særlig bidra til å oppfylle følgende nasjonale mål for naturmangfold:

- Ingen arter og naturtyper skal utryddes som følge av menneskelig aktivitet, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.
- Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.

[Her kan du lese mer om bakgrunn for skogvernrapporten](#)

Statsforvalterens vurdering

Området Andvik søraust (Baklåsjuvet - Seljevika - Djupavika), vil etter Statsforvaltaren si vurdering bidra til å oppfylle generelle manglar i skogvernet knytt til lågareliggande skogareal, bonitetsfordeling, raudlista naturtype og innslag av biologisk gamle eiketree. Av dei fylkesspesifikke manglane i Rogaland vil området bidra til å fange opp lågurtedellauvskog som er raudlista i kategori sårbar (VU).

Verneindeks

Naturgitt mangfold		1.75	Naturskognærhet		1.50	Størrelse		2.00
Variasjon - kartleggingsenheter	2		Død ved arealfigur, arealandel	1		Barskog, bjørkeskog i NB og MB	0	
Arealandel av kalk- og baserik skogsmark og regnskog	1		Død ved mengde	2		Skogsmark i sørboreal og boreonemoral vegetasjonssone	0	
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for hele området	3		Død ved variasjon	1		Edellauvskog, kalkskog og regnskog.	2	
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for kalkrike kartleggingsenheter i området	1		Gamle store trær arealfigur, arealandel	3				
			Gamle/store trær	2				
			Trær med spesielt livsmedium	0				

Scoringsverdi for avgrenset område

5.25

Nøkkeltall

Vegetasjonssone
Sørboreal, boreonemoral og nemoral

Sammendrag av arealressursene fra AR5	
Type	Areal (daa)
Skog	359.52
Hav	0.97
Sum	360.48

Skogbonitet fra AR5-kart	
Type	Areal (daa)
Impediment	204.23
Særs høy	8.81
Høy	146.48
Sum	359.52

Kartleggingsenheter			
Kartleggingsenhet	Kode	Areal (daa)	Kalktrinn
blåbærskog	T4-C-1	146.56	abc
svak lyng-lågurtskog	T4-C-10	24.94	de
svak lågurtskog	T4-C-2	2.46	de
bærlyngskog	T4-C-5	59.45	abc
svak bærlyng-lågurtskog	T4-C-6	107.22	de
bærlyng-lågurtskog	T4-C-7	6.65	fg
Sum		347.28	

Naturområde - kategori	
Type	Areal (daa)
Kalkfattig mosaikk	310.94
Kalkrik mosaikk	4.32
Liggende død ved	8.71
Store gamle trær	23.31

Trær med spesielt livsmedium	
Type	Vektet trinn
Tre med brannspor	0 per daa
Hengelavstre	0 per daa
Hult lauvtre	0-1 per daa

Treslag	
Type	Vektet trinn
Ask	0 - 2,5
Bjørkeslekta	10 - 25
Edellauvtreandel	25 - 50
Eikeslekta	25 - 50
Furu	25 - 50
Gråor	0 - 2,5
Hassel	0 - 2,5
Lind	0 - 2,5
Osp	10 - 25
Rogn	0 - 2,5
Selje	0 - 2,5

Død ved	
Type	Vektet trinn
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), lite nedbrutt	1-2 per daa
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), sterkt nedbrutt	1-2 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), lite nedbrutt	0-1 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), sterkt nedbrutt	0-1 per daa
Stående død ved , Middels dimensjon (10–30 cm)	1-2 per daa
Stående død ved , Stor dimensjon (> 30 cm)	0-1 per daa

Store gamle trær	
Type	Vektet trinn
Furu	0-1 per daa
Gran	0-1 per daa
Boreale lauvtrær	0-1 per daa
Edellauvtrær	0-1 per daa

Arter				
Navn	Vitenskapelig navn	Artsgruppe	Rødlistestatus	Reg. dato
Kystsotmose	Andreaea hookeri	moser	Livskraftig	21.5.2024
Ask	Fraxinus excelsior	karplanter	Sterkt truet	21.5.2024
Barlind	Taxus baccata	karplanter	Sårbar	21.5.2024

Rødlistede naturtyper


Rødlistede naturtyper		
Type	Status	Areal (daa)
Lågurtedellauvskog	Sårbar (VU)	112.26

Kartleggers vurdering av prosjektområdet

Området er tydelig dominert av fattige til intermediære naturtyper, og det ble registrert kun enkelte små områder med lågurtvegetasjon. Sentrale og vestre deler er preget av nakent berg over skoggrense. For det meste består området av kalkfattig furuskog med innslag av fattig myrskogsmark og enkelte tjern. Det ble observert enkelte gamle furuer, som for eksempel i lia nord for Baklåsjuvet. Disse forekomstene dekker kun lite areal. Store areal er fanget opp som kalkfattig mosaikk dominert av blåbærskog. Partier med liggende død ved forekommer spredt, men disse dekker forholdsvis små areal og består overveiende av bjørkelæger. Det ble observert sparsomt med gammel bjørk og rogn, f.eks. sørvest for Andvikvatnet. Områdets største verdier er hovedsakelig knyttet til forekomster av store gamle edelløvtrær. Det er spredt med gamle eiketrær (og ospetrær) i de bratte liene ned mot fjorden øst for Indre Ryfylkeveien. Enkelte av disse er styvingstrær, til dels med hulrom. For det meste er avstanden mellom de store gamle eiketrærne for stor for å kunne fanges opp som store gamle trær etter instruksen, selv om dimensjonene til dels er langt over inngangsverdien. Øst for Andvikvatnet er det flere gamle hasselbusker og noen få styvete almetrær med omkrets opp til 3 meter, i tillegg til gamle rogn. Til dels er terrenget utilgjengelig, bl.a. liene øst for Baklåsjuvet, men avstandsvurdering ga inntrykk på at det er en (knappt) eikedominert skog. Andre treslag i denne blandings-skogen er osp, furu, bjørk, hassel og enkeltforekomster av lind. Også høyereliggende partier i lia nord for Såta i vest er til dels utilgjengelig. Undersøkelsesområdet har mest furu, og ellers innslag av bjørk, rogn, gråor, osp, svartor, eik, lind, hassel, alm (VU), ask (VU) og barlind (VU). Av karplanter kan det nevnes omtrent 40 barlind øst for Ørnadalen. Blant lav ble det blant annet gjort noen få funn av blanknål (NT) og rødhodenål (på barlind). Blant sopp ble antatt tyrikjuke (NT) funnet på furulåg. Det ble ikke funnet rødlistede naturtyper. Det finnes omtrent 170 daa eikedominert skog, som har stort udekket vernebehov i Rogaland fylke (Framstad m.fl. 2017). Ellers fanger området i liten grad opp viktige mangler i skogvernet i fylket. Det finnes en del spor etter menneskelig påvirkning, dette mest i nordvest. Skogen er over store deler preget av tidligere husdyrbeite. Det ble registrert enkelte hytter og forfalne bygninger, samt enkelte styvingstrær. Det er innslag av granplantefelt, både i øst og vest. Indre Ryfylkevei går gjennom søndre del, men stort sett i tunnel. Området krysses også av en strømtrase. Ved feltarbeidet ble det observert hjort, og det går flere hjortetråkk. Barlindtreene i øst var sterkt nedbeitet av hjortevilt.

Kart verneindeks - naturskognærhet

Kart verneindeks - Naturgitt mangfold



7/17

Bilder









