

Hva skjer'a?

Demenskonferansen 2020

Sverre Bergh
Forskningsleder - AFS

Hvilke spørsmål vil jeg besvare?

- Hvor mye vold er det på norske sykehjem?
- Hvem er det som får mest en-til-en pleie i sykehjem?
- Er sosial kontakt beskytende mot demens?

Vold i sykehjem



The image shows a screenshot of an Aftenposten news article. At the top, the Aftenposten logo is visible along with navigation links for 'A-magasinet', 'Osloby', 'Sport', and 'Meninger'. On the right, there are links for 'Bli abonnent', 'Logg inn', and 'Meny'. Below the header is a large black and white photograph showing a close-up of a person's arm and shoulder, with another person's hands visible, suggesting a physical interaction or restraint.

Nesten 8 av 10 pleieansatte har sett kolleger utsette eldre for vold og forsømmelse på sykehjem

Smelling i doror og bevylett klofting. Mangl på tappnucc og

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Elder abuse in Norwegian nursing homes: a cross-sectional exploratory study



Anja Botngård^{1*}, Arne Henning Eide^{1,2}, Laura Mosqueda³ and Wenche Malmedal¹

Undersøkelse i 100 norske sykehjem

- Data innhentet i perioden Okt. 2018-Jan. 2019
- Undersøke personalets vold mot pasienter det siste året
- Hvor ofte har personalet observert vold?
- Hvor ofte har de selv utøvd vold?
- 3693 sykehjemsansatte svarte
 - 60.1 % av spurte

Resultater

- 100 sykehjem forespurt, 27 ville ikke være med, inviterte 30 nye store sykehjem til for å få representativitet
 - Store og små sykehjem
 - By og land
 - Kommunale (94 %) og private
 - Langtids avd. (63.7 %), demens avd. (21.8 %) og korttids avd. (14.5 %)




Fig. 2 Nursing home ($N=100$) prevalence rates according to observed/perpetrated elder abuse type

Received: 13 April 2018

Accepted: 3 November 2018

DOI: 10.1002/gps.5026

RESEARCH ARTICLE

WILEY International Journal of
Geriatric Psychiatry

The use of direct care in nursing home residents: A longitudinal cohort study over 3 years

Corinna Vossius^{1,2}  | Geir Selbæk^{2,3,4} | Jūratė Šaltytė Benth^{2,5,6} | Anders Wimo^{7,8} |
Sverre Bergh^{2,3}




FIGURE 2 Direct care time specified after PADL, IADL, and supervision [Colour figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]




FIGURE 3 Trajectories of total direct care time [Colour figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]

Mer en-til-en pleie var assosiert med.....

- Lavere alder
- Mer alvorlig demens
- Dårligere ADL funksjon
- Mer affektive symptomer
- Mer psykose symptomer

RESEARCH ARTICLE

Association of social contact with dementia and cognition: 28-year follow-up of the Whitehall II cohort study

Andrew Sommerlad^{1,2*}, Séverine Sabia^{3,4}, Archana Singh-Manoux^{3,4},
Glyn Lewis^{1,2}, Gill Livingston^{1,2}

1 Division of Psychiatry, University College London, London, United Kingdom, 2 Camden and Islington NHS Foundation Trust, London, United Kingdom, 3 Epidemiology of Ageing and Neurodegenerative Diseases, Inserm U1153, Université de Paris, Paris, France, 4 Department of Epidemiology and Public Health, University College London, London, United Kingdom

* a.sommerlad@ucl.ac.uk

Sosial kontakt og demens

- Fulgte 10 228 deltagere fra 1985 til 2017
- Alle svarte 6 ganger, på skriftlige spørsmål om sosial kontakt
- Demens var vurdert via tre databaser (kliniske og mortalitet)
- Deltakere var 35-55 år ved baseline
- 33,1 % kvinner, bodde i England

Resultater - Sosial kontakt

- Ved 50 år:
 - Hazard Ratio 0.92 (95 % CI 0.83-1.02, p=0.13)
- Ved 60 år:
 - Hazard Ratio **0.88** (95 % CI 0.79-0.98, p=0.02)
- Ved 70 år:
 - Hazard Ratio 0.91 (95 % CI 0.78-1.06, p=0.23)
- Assosiasjonen var koblet mot venner, ikke familie relasjoner